



CONSEILS sur les Mesures Barrières en Pneumologie Libérale (SAR)

Patients	Secrétariat	Salle d'attente et autres	Pneumologue (et personnels/IDE)	Unité de consultation et examens complémentaires
<p>Les consultations sont espacées pour éviter les accumulations en salle d'attente</p> <p>Appeler les patients avant le RdV afin de confirmer qu'ils ne présentent pas de symptômes et de leur rappeler les gestes barrières et règles d'accès (pas d'accompagnant, Respect de l'horaire)</p> <p>Le prévenir qu'il vient avec un masque si possible, son stylo et CB à Préférer</p> <p>L'accompagnant reste dehors (sauf enfant ou handicapé)</p> <p>Masque chirurgical si COVID + ou FDR sinon masque ou protection personnelle a minima</p> <p>SHA ou lavage des mains et prise de température à l'entrée du cabinet</p>	<p>Accueil au moins à 1 m (si besoin marquage au sol)</p> <p>Hygiaphone ou panneau de plexiglas si compatible avec la configuration des lieux</p> <p>Masque ou visière couvrant le visage</p> <p>SHA entre chaque patient Pas de prêt de stylo</p> <p>Mise en place d'un bio nettoyage plus fréquent des plans de travail, des surfaces claviers, souris, écrans LAF (plexiglass ou feuille plastique), ordinateurs...</p>	<p>Espacer les sièges d'au moins 1 m (condamner ou supprimer des sièges, si besoin marquage au sol) ou cloison de plexiglas si possible</p> <p>Éviter le face à face patients (au mieux qu'un patient en salle d'attente)</p> <p>Suppression des revues, journaux et jouets</p> <p>Désinfecter sièges et poignées de porte après chaque consultation</p> <p>Contrôler la climatisation (éviter si par air recyclé)</p> <p>Aérer les pièces</p> <p>Toilettes : désinfection régulière (lingettes antiseptiques) + sacs poubelles refermables et lavage des mains</p>	<p>Masque FFP2 si possible sinon chirurgical +/- Lunettes de protection</p> <p>SHA ou lavage des mains entre chaque patient (sèches mains, mouchoirs jetables)</p> <p>Si patient COVID + : masque FFP2 requis, lunettes, gants jetables, sur blouse ou tablier plastique ou casaque chirurgicale, protèges chaussures et retrait sans toucher l'extérieur de tout ce qui fait face ou a été en contact avec le patient</p>	<p>Désinfection entre chaque passage des sièges et accoudoirs, des surfaces claviers, souris, écrans LAF (plexiglass ou feuille plastique) et matériels (stétos, tensiomètre...)</p> <p>Limiter la climatisation et aérer les pièces</p> <p>Poubelle spécifique avec sac refermable pour les déchets</p> <p>Désinfection entre chaque passage des surfaces utiles pour la radiologie</p> <p>Désinfection du pléthysmographe (cf recos SPLF et recos de désinfection en cours)</p> <p>Désinfection des poly(somno)graphes (recos en cours)</p> <p>Désinfection des échographes</p>

Facteurs de Risque de COVID

- Age > 70 ans
- Maladies CV ou respiratoires chroniques
- Immunodéprimé
- Cancer, hémopathie, cirrhose
- Grossesse (à tout stade)
- Obésité, diabète
- Insuffisance rénale
- Prise AINS dans les 5j, AIS au long cours

Gestion du masque

- Appui à la racine du nez
- Couvre le visage
- Test d'étanchéité + si FFP2
- Ne pas se toucher le visage lorsque l'on porte un masque
- Enlever le masque par les élastiques
- Si possible, changement si humide ou toutes les 4h si chirurgical ou toutes les 8h si FFP2
- Avant et après le masque, lavage des mains ou SHA
- Si lavable, 30 min à 60° + sèche-linge

Au total : reprise d'activité possible si

- Respect de ces conditions d'hygiène et de protection
- Diminution et étalement des flux
- **Limitation à l'urgence, aux suivis et traitements prioritaires (pathologies chroniques sévères, cancer...) au moins Jusqu'au 11 mai 2020**
- **Ces conseils ne se substituent pas aux recommandations des autorités sanitaires (évolutives)**